



FORMULAIRE D'ADHÉSION-ORDONNANCE COLLECTIVE

Nom de l'ordonnance	Initier une ordonnance de chloroquine OCQHS-01
Date de mise en vigueur	2009
Date de révision	2012
Professionnels habilités	Pharmaciens de la communauté

1. Nous avons pris connaissance de l'ordonnance collective de Chloroquine OCQHS-01.
2. Nous acceptons de valider et d'exécuter l'ordonnance collective de chloroquine suite à l'évaluation de l'infirmière.
3. Nous comprenons qu'un médecin répondant est identifié pour chaque ordonnance collective. Ce médecin répondant n'a pas évalué ou vu le client. Il n'est pas le médecin traitant .Il est répondant pour le contenu scientifique de l'ordonnance collective et peut être rejoint au besoin.
4. Nous comprenons qu'une fiche de liaison remplie par l'infirmière est remise par le client au pharmacien. Les coordonnées pour rejoindre l'infirmière apparaissent sur la fiche.

_____ date : _____
Signature du pharmacien propriétaire

Signature des pharmaciens concernés :

_____ date : _____

_____ date : _____

_____ date : _____

Nom de la pharmacie; _____

Adresse : _____

Téléphone : _____ FAX : _____

Courriel : _____

PROCESSUS D'ÉLABORATION	
<p><u>Rédigé par :</u></p> <p>Marie-Josée Pépin</p> <p>Infirmière en immunisation</p>	<p>Juin 2009</p>
<p><u>Validé par :</u></p> <p>Hélène Poireau,</p> <p>Directrice, Groupe-Santé-Hélios</p>	<p>Juin 2009</p>

PROCESSUS D'APPROBATION	
<p>Approuvé par :</p> <p>Dr. Harpin 64127</p> <p>Dr. Harvey 1884519</p> <p>Dr.Denicourt 1800317</p>	<p>Juin2009</p>

Fiche technique : Chloroquine Phosphate

<u>NOM GÉNÉRIQUE</u>	<u>CHLOROQUINE PHOSPHATE</u>
<u>Classification</u>	Antipaludéen
<u>Mode d'action</u>	Agit au niveau de la phase érythrocytaire en tuant les schizontes sanguins.
<u>Présentation</u>	Comprimés de 250 mg (150 mg base)
<u>Prophylaxie</u>	Débuter une semaine avant l'arrivée et poursuivre jusqu'à 4 semaines après le départ de la zone impaludée.
<u>Posologie pour adultes</u>	500 mg (2 comprimés de 250 mg) (nonobstant le poids) 1 fois/semaine avec de la nourriture.
<u>Posologie pour enfants</u> (5 mg/kg base)	<p>< 10 kg : ¼ comprimé de 250 mg , 1 fois /semaine.</p> <p>10-19 kg : ½ comprimé de 250 mg, 1 fois/semaine.</p> <p>20-30 kg : 1 comprimé de 250 mg, 1 fois/semaine.</p> <p>31-45 kg : 1 ½ comprimé de 250 mg, 1 fois/semaine.</p> <p>> 45 kg : dose adulte.</p>
<u>Contre-indications</u>	<u>Voir ordonnance collective</u>
<u>Effets secondaires</u>	<u>Fréquents:</u> prurit (personnes race noire), céphalée, nausées ,vomissements, , inconfort abdominal, insomnie, vertige, vision trouble, goût amer.

Effets secondaires (suite)	<p><u>Peu fréquents;</u> changement de pigmentation pileuse, éruptions cutanées, opacité cornéenne réversible, exacerbation du psoriasis.</p> <p><u>Rares;</u> Alopécie partielle, coloration anormale des ongles et des muqueuses, surdité nerveuse, photophobie, myopathie, dyscrasies sanguines, psychose, convulsions.</p>
-----------------------------------	--



ANNEXE 3

Fiche de liaison

Initier une ordonnance de Chloroquine Phosphate

DATE : _____

Nom: _____

Adresse : _____

Tél : _____

DDN : _____

ALLERGIE : _____

POIDS : _____

J'ai procédé à l'évaluation de la personne ci-haut mentionnée et elle est une candidate à la prise de Chloroquine. Il n'y a aucune contre-indication à la prise de cette médication. Cette personne a reçu l'enseignement relatif à la prise de cette médication et des effets secondaires potentiels.

Prophylaxie à débiter 1 semaine avant le départ, continuer durant le séjour et poursuivre jusqu'à 4 semaines après le départ de la zone impaludée.

Posologie;

- Adultes : 2 comprimés de 250 mg , 1 fois/semaine
- Enfants <10 kg : ¼ comprimé de 250 mg, 1 fois/semaine
- Enfants 10-19 kg : ½ comprimé de 250 mg , 1 fois/semaine
- Enfants 20-30 kg : 1 comprimé de 250 mg, 1 fois/semaine
- Enfants 31-45 kg : 1 ½ comprimé de 250 mg, 1 fois/semaine
- Enfants > 45 kg : 2 comprimés de 250 mg , 1 fois/semaine

Comprimés : _____

Nom et prénom de l'inf.

Signature de l'inf.

no. Permis OIIQ

Étampe de la clinique

Médecin répondant

No. De permis

téléphone